

## Kartoffeln

# Agria

## Pommes de terre

Speisesorte

*Variété de consommation*

Reifegruppe

mittelfrüh bis mittelspät/  
*mi-précoce à mi-tardive*

*Maturité*

Züchter

Kartoffelzucht Böhm KG  
Postfach 1968  
D-2120 Lüneburg

*Obtenteur*

Abstammung

Quarta × Semlo

*Ascendance*

Aufnahme in die  
offizielle Sortenliste


1988

*Inscription sur  
la liste officielle*

Vertreter

Schweiz. Saatzuchtverband/  
*Fédération suisse des sélectionneurs*  
CH-4500 Solothurn/Soleure

*Représentant*



### 1. Morphologische Merkmale

Knolle: Form: langoval bis kurzoval  
Grösse: gross  
Augen: flach bis mitteltief  
Fleischfarbe: tiefgelb  
Schale: gelb, leicht genetzt

Stengel: mittelhoch, wenig zahlreich, kräftig,  
Achseln violett

Blatt: matt, graugrün, gross

Blüten: weiss, stark blühend

### 1. Caractères morphologiques

*Tubercule: forme: oblong long à oblong court  
taille: grosse  
yeux: superficiels à mi-profonds  
chair: jaune foncé  
peau: jaune, légèrement réticulée*

*Tige: taille moyenne, peu nombreuses,  
vigoureuses, aisselles violettes*

*Feuille: mate, gris-vert, grande*

*Fleur: blanche, floraison abondante*

## 2. Werteigenschaften

Ertrag:	sehr hoch
Kalibriererausbeute:	hoch
Stärkegehalt:	mittel bis niedrig (13–15,5 %)
Stärkeertrag:	mittel bis hoch
Kochtyp:	B–C
Verfärbung:	
roh:	gering
gekocht:	gering
Reduzierende Zucker:	sehr gering
Verarbeitungseignung:	Frites, Rösti

## 2. Caractéristiques agronomiques et technologiques

<i>Rendement:</i>	<i>très élevé</i>
<i>Calibre:</i>	<i>grand</i>
<i>Teneur en amidon:</i>	<i>moyenne à faible (13–15,5 %)</i>
<i>Rendement amidon:</i>	<i>moyen à élevé</i>
<i>Type culinaire:</i>	<i>B–C</i>
<i>Altération de la couleur:</i>	
<i>chair crue:</i>	<i>faible</i>
<i>chair cuite:</i>	<i>faible</i>
<i>Sucres réducteurs (teneur):</i>	<i>très faible</i>
<i>Utilisation technologique:</i>	<i>frites, rösti</i>

Der Bericht über die Hauptversuchsergebnisse 1985–1987 ist publiziert in:  
Landwirtschaft Schweiz **2** (10), 1989

*Les résultats des essais principaux 1987–1989 sont publiés dans:  
Landwirtschaft Schweiz **2** (10), 1989*

## 3. Anfälligkeiten

Krebs:	anfällig
Nematoden:	nicht anfällig (Pathotyp Ro <sub>1</sub> )
Krautfäule:	mittel
Braunfäule:	gering
Schorf: Flachschorf:	mittel
Pulverschorf:	stark
Eisenfleckigkeit:	mittel bis gering
Schlagempfindlichkeit:	mittel bis gering
Blattroll:	mittel
Virus Y:	gering

## 3. Sensibilité

<i>Galle verruqueuse:</i>	<i>sensible</i>
<i>Nématodes:</i>	<i>pas sensible au pathotype Ro<sub>1</sub></i>
<i>Mildiou des fanes:</i>	<i>moyenne</i>
<i>Mildiou des tubercules:</i>	<i>faible</i>
<i>Gale commune:</i>	<i>moyenne</i>
<i>Gale poudreuse:</i>	<i>élevée</i>
<i>Taches de rouille:</i>	<i>moyenne à faible</i>
<i>Sensibilité aux chocs:</i>	<i>moyenne à faible</i>
<i>Virus de l'enroulement:</i>	<i>moyenne</i>
<i>Virus Y:</i>	<i>faible</i>

## 4. Besondere Hinweise

Immun gegen Virus X, Agria ist sehr keimruhig. Die Inkubationsdauer ist kurz. Zurückhaltung bei Stickstoffdüngung!

## 4. Remarques particulières

*Réfractaire au virus X, Agria a une longue dormance. La durée d'incubation est courte. Modérer la fumure azotée!*

Agria ist eine gute, grossfallende Speisesorte für Frischkonsum und Verarbeitung.

*Agria est une bonne variété qui produit de gros tubercules. Elle se consomme à l'état frais et se prête à la transformation par l'industrie alimentaire.*