

Kartoffeln

Speisesorte

Reifegruppe

Züchter

Abstammung

Aufnahme in die
Sortenliste

Vertreter

Gourmandine

mittelfrüh/*mi-précoce*

Bretagne Plants
F-29460 Hanvec

Charlotte × Estima

2006

swisssem
Schweiz. Saatgutproduzenten-Verband/
*Association suisse des producteurs
de semences*
1567 Delley

Pommes de terre

Variété de consommation


Maturité

Obtenteur

Ascendance

*Inscription
sur la liste suisse*

Représentant



1. Morphologische Merkmale

Knolle	Form:	langoval bis lang
	Grösse:	mittelgrossfallend
	Augen:	flach
	Fleischfarbe:	gelb
	Schale:	gelb
Stängel	hoch, mittelaufrecht, leicht pigmentiert	
Blatt	tief- bis mittelgrün, oval und mittelglänzend	
Blüten	rotviolett, stark bis mittel blühend	

1. Caractères morphologiques

Tubercule	forme:	oblongue à longue
	taille:	moyenne
	yeux:	superficiels
	chair:	jaune
	peau:	jaune
Tige	de taille haute, port mi-dressé, avec légère pigmentation	
Feuille	vert foncé à tendre, ovale et semi-brillante	
Fleur	rouge violacé, floraison abondante à moyenne	

2. Werteigenschaften

Ertrag:	mittel
Kalibriererausbeute:	hoch
Stärkegehalt:	niedrig (12-14%)
Stärkeertrag:	niedrig
Kochtyp:	B-A
Verfärbung	
roh:	gering
gekocht:	gering
Reduzierende Zucker:	mittel (0,88% TS)
Verarbeitungseignung:	keine
Vorkeimdauer:	5-6 Wochen

3. Anfälligkeiten

Krebs:	nicht anfällig
Nematoden:	anfällig
Krautfäule:	anfällig
Braunfäule:	anfällig
Flachschorf:	mittel
Pulverschorf:	mittel
Eisenfleckigkeit:	mittel
Blattroll:	mittel
Virus Y:	anfällig
Schlagempfindlichkeit:	gering bis mittel
Abkeimungs- empfindlichkeit:	mittel bis hoch

4. Besondere Hinweise

Gourmandine hat eine ausgesprochene Keimruhe und einen zögerlichen Auflauf. Unbedingt Vorkeimen, lange Keime sind spröde und brechen bei der Pflanzung leicht ab.

Gourmandine ist eine mittelfrühe, festkochende Speisekartoffelsorte mit guter Lagerungseignung.

2. Caractéristiques agronomiques et technologiques

Rendement:	moyen
Calibre commercial:	élevé
Teneur en amidon:	faible (12-14%)
Rendement amidon:	faible
Type culinaire:	B-A
Altération de la couleur	
chair crue:	faible
chair cuite:	faible
Sucres réducteurs (teneur):	moyenne (0,88% MS)
Utilisation technologique:	aucune
Prégermination:	5-6 semaines

3. Sensibilités

Galle verruqueuse:	résistante
Nématodes:	sensible
Mildiou des fanes:	sensible
Mildiou des tubercules:	sensible
Gale commune:	moyenne
Gale poudreuse:	moyenne
Taches de rouille:	moyenne
Virus de l'enroulement:	moyenne
Virus Y:	sensible
Sensibilité aux chocs:	faible à moyenne
Sensibilité à l'égermage:	moyenne à élevée

4. Remarques particulières

Gourmandine a une dormance très prononcée et une levée très lente. Elle doit être prégermée; ses grands germes se cassent facilement à la plantation.

Gourmandine est une variété mi-précoce de consommation de type Nicola. Elle se conserve bien.